

# Allevio<sup>®</sup>

## migränkateter

## Patientinformation

**Du har blivit ordinerad en behandling som innebär att en liten mängd bedövningsvätska förs in i den bakre delen av näsan.**

För att säkert komma på rätt plats med bedövningsvätskan använder man ett tunt, mjukt plaströr.

Det gör inte ont men självklart kan man uppleva lite snabbt övergående obehag när ett mjukt plaströr, förs in genom respektive näsborre.

Behandling tar bara någon minut men du får ligga kvar på undersökningsbritten en stund efteråt så att behandlingen får effekt.



### Att tänka på

- Du får inte vara överkänslig mot bedövningsvätska, samma som används när du är hos tandläkaren och önskar bedövning.

### Så här går det till

Sjelva behandlingen tar bara ett par minuter

1. Du får lägga dig på en vanlig undersökningsbritten.
2. Huvudet ska vara lätt bakåtböjt under hela behandlingen.
2. Plaströret förs in i ena näsborren (se bild →).
3. Bedövningsvätskan förs in genom plaströret.

En del av vätskan rinner ner genom halsen, det är helt ofarligt men kan smaka illa och man kan känna sig bedövad i halsen en stund efteråt.

4. Samma procedur genomförs i den andra näsborren.
5. Du får ligga kvar på undersökningsbritten i 15 minuter.

*Behandlingen genomförs av utbildad personal och innebär inga risker för dig.*

